

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 温清飲 エキス散 (分包)

ウンセイイン

12

分包

ウチダの温清飲エキス散(分包)は、漢方処方にしたいがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|----------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等が見られ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品1日量 [3包 (1包2g)] 中
温清飲エキス.....3.15g

| |
|----------------|
| トウキ.....1.5g |
| ジオウ.....1.5g |
| シャクヤク.....1.5g |
| センキュウ.....1.5g |
| オウレン.....0.75g |
| オウゴン.....0.75g |
| サンシシ.....0.75g |
| オウバク.....0.75g |

賦形剤として乳糖水和物・パレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mg、その他1成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

効能・効果

皮膚の色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：
月経不順、月経困難、血の道症^注、更年期障害、神経症

＜効能・効果に関連する注意＞

注)「^{ちのみちしょう}血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

| 年齢 | 1回量 |
|-----------|---------|
| 大人(15歳以上) | 1包 |
| 15歳未満 | 服用しないこと |

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 新潟県上越市大潟区蜘蛛池 1755-3