ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい、また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい、

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 四薬温血湯 (分包)

シヤクオンケツトウ

ウチダの四薬温血湯(分包)は、漢方処方にしたがい生薬を配合 し抽出して得た水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたも のです.

✓ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談 すること
- (1) 医師の治療を受けている人.
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人.
- (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人,体の弱い人).
- (4) 胃腸の弱い人
- (5)下痢しやすい人
- (6) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こした ことがある人.
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性 があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感,食欲不振,腹痛

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、この ような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用 を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談すること
 - 下痢
- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を 中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売 者に相談すること

効能・効果

皮膚が枯燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の 諸症:産後あるいは流産後の疲労回復,月経不順,冷え症, しもやけ、しみ、血の道症注)

〈効能・効果に関連する注意〉

注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など 女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだ ちなどの精神神経症状および身体症状のことである.

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する.

次の「日重と「日の日及前なたば及前に版		
年 齢	1 回量	
大人(15 歳以上)	1包	
15 歳未満 7 歳以上	2/3 包	
7歳未満4歳以上	1/2 包	
4 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用さ せること.

成分・分量

本品 1 日量 [3 包 (1 包 2 g)] 中

「トウキ・・・・・1.8g) シャクヤク·····1.8g センキュウ・・・・・・1.8g | -|ジオウ・・・・・1.8gJ

四物湯エキス・・・・・・・2.40 g

賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤と してメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する.

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管するこ
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること.
- (3)他の容器に入れ替えないこと. (誤用の原因になったり品 質が変わる)
- (4) 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を 折り曲げて保管し、2日以内に服用すること.

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店また は下記にお願い申し上げます.

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土, 日, 祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる ことがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区蜘ケ池 1755-3