ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい.また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい.

第3類医薬品

ウチダの **ヨ ク イ ニ ン** エキス細粒(分包)

ウチダのヨクイニンエキス細粒(分包)は、肌あれ・いぼとりに 愛用されている日本薬局方ヨクイニン(ハトムギの種子)から 抽出したエキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです.

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり, 副作用が起こり やすくなる)

次の人は服用しないこと 生後3ヵ月未満の乳児.



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談 すること
 - (1) 医師の治療を受けている人.
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人.
 - (3) 胃腸の弱い人.
 - (4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こした ことがある人.
- 2. 服用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性 があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、この ような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用 を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談すること
 - 下痢
- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を 中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売 者に相談すること

効能・効果

いぼ、皮膚のあれ

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する.

年 齢	1 回量
大人(15 歳以上)	1包
15 歳未満 7 歳以上	2/3 包
7歳未満4歳以上	1/2 包
4歳未満2歳以上	1/3 包
2 歳未満	1/4 包

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服 用させること
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先 し、止むを得ない場合にのみ服用させること.

成分・分量

本品 1 日量 [3 包 (1 包 2 g)] 中 ヨクイニンエキス

(原生薬換算量 20 g) ······1.50 g 賦形剤として乳糖水和物・バレイショデンプン、吸湿防止剤と してメタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する.

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管するこ
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること.
- (3)他の容器に入れ替えないこと. (誤用の原因になったり品 質が変わる)
- (4) 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を 折り曲げて保管し、2日以内に服用すること.

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店また は下記にお願い申し上げます.

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

03-3806-4141 TEL 受付時間 9:00~17:30 (土, 日, 祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる ことがありますが、効能・効果にかわりはありません.



ウチダ和漢薬 株式会社

新潟県上越市大潟区蜘ケ池 1755-3