

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

## ウチダの 八味丸

ハチミガン

ウチダの八味丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の人は服用しないこと  
(1) 胃腸の弱い人。  
(2) 下痢しやすい人。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。  
(4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：  
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する

年齢	1回量
成人(15歳以上)	2g(20丸)
15歳未満	服用しないこと

## 成分・分量

本品 6.154g (60丸1日分) 中  
 ジオウ 8g  
 サンシュユ 4g  
 サンヤク 4g  
 タクシャ 3g  
 ブクリョウ 3g  
 ボタンピ 3g  
 ケイヒ 1g  
 ブシ末 0.097g  
 以上の割合で混合し粉末化したもの 5.031g  
 丸薬の結合剤としてハチミツを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3