

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 理中丸

リチュウガン

ウチダの理中丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、 つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

- 1ヵ月位(急性胃炎に服用する場合には5~6回、下痢、嘔吐に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品	9.231g (90丸 1日分) 中		
ニンジン	3g	} 以上の割合で混合し 粉末化したもの	7.692g
カンゾウ	3g		
ビャクジュツ	3g		
カンキョウ	3g		
丸薬の結合剤としてハチミツを含有する。			

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

体力虚弱で、疲れやすくて手足などが冷えやすいものの次の諸症:

胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する

年齢	1回量
15才以上	20~30丸
15才未満7才以上	13~20丸
7才未満4才以上	10~15丸
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3