ご使用に際しては，この添付文書を必ずお読み下さい.また，必要な時に読めるよう大切に保管して下さい.

第２類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 防已黄耆湯

ボウイオウギトウ

ウチダの防已黄耆湯は漢方処方にしたがって，生薬を配合した煎じ薬で，特異な芳香があります.

⚠ 使用上の注意

相談すること

１．次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人.
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人.
(3)高齢者.
(4)今までに薬等により発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人.
(5)次の症状のある人.
むくみ
(6)次の診断を受けた人.
高血圧，心臓病，腎臓病

２．服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤，かゆみ
消化器	食欲不振，胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある.
その場合は直ちに医師の診療を受けること.

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等が見られ，これらが急にあらわれたり，持続したりする.
偽アルドステロン症，ミオパチー	手足のだるさ，しびれ，つっぱり感やこわばりに加えて，脱力感，筋肉痛があらわれ，徐々に強くなる.
肝機能障害	発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる.

３．１ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
４．長期連用する場合には，医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

水ぶとりで身体が重だるく発汗傾向が強く，尿利減少，下半身の浮腫，膝関節の腫痛などのあるもの。
腎臓病，肥満症，多汗症，関節炎，脚気のむくみ

用法・用量

年齢	１日量
大人（15歳以上）	１袋（１日分）につき水600mL（約３合３勺）を加えあまり強くない火にかけ300mL（約１合７勺）に煮つめ袋をとり出し，２～３回に分けて食前１時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品１袋中
ボウイ　5.0g
オウギ　5.0g
ソウジュツ　3.0g
タイソウ　3.0g
カンゾウ　1.5g
ショウキョウ　1.0g

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること.
(2)小児の手の届かない所に保管すること.
(3)他の容器に入れ替えないこと.（誤用の原因になったり品質が変わる.）

●お問い合わせ先
本品の内容についてのお問い合わせは，お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます.
株式会社ウチダ和漢薬　お客様相談センター
ＴＥＬ　０３－３８０６－４１４１
受付時間　9：00～17：30（土，日，祝日を除く）

◆本剤中にはソウジュツが配合されているため袋内に白色の結晶が析出することがありますが，品質上は問題ありません.
◆本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なることがありますが，効能・効果にかわりはありません.

株式会社 ウチダ和漢薬
＊ 新潟県上越市大潟区蜘ケ池1755-3