

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 白虎加桂枝湯

ビヤッコカケイシトウ

ウチダの白虎加桂枝湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。

成分・分量

本品1袋中				
チ	モ	5.0g		
コ	ウ	ベ	イ	8.0g
セ	ツ	コ	ウ	15.0g
カ	ン	ゾ	ウ	2.0g
ケ	イ	ヒ		4.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

 使用上の注意


相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - * (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸虚弱で冷え症の人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
 - むくみ
 - (8) 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなりません
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

身体灼熱し、上衝^{注1)}して煩渴^{注2)}あり、骨節疼痛し頭痛、頭汗、掻痒感などを伴うもの

諸熱性病で高熱のもの、筋炎、骨膜炎、湿疹、乾癬^{注3)}

注1) 「上衝^{じやうしやう}」とは気が上にのぼること、のぼせを指します。

注2) 「煩渴^{はんかつ}」とは胸中が悶々として苦しく感じられ、口が乾いて湯水を欲するものを指します。

注3) 「乾癬^{かんせん}」とは皮膚が乾燥し、かゆいものを指します。

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8