

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

# ウチダの 猪苓湯

チヨレイトウ

ウチダの猪苓湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。

### ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効能・効果

尿量が減少し、尿が出にくく、排尿痛あるいは残尿感のあるもの。

### 用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水600mLを加え、あまり強くない火にかけ、約300mLに煮つめ、袋をとり出し、3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
15歳未満7歳以上	大人の煎液の2/3量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
7歳未満4歳以上	大人の煎液の1/2量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
4歳未満	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 成分・分量

本品1袋（1日分）中	
チヨレイ	3.0g
ブクリヨウ	3.0g
タクシャ	3.0g
ゼラチン	3.0g
カッセキ	3.0g
全量	15.0g

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\* 新潟県上越市大湯区蜘蛛池 1755-3