

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

## ウチダの漢方製剤

## ウチダの 大防風湯

ダイボウフウトウ

ウチダの大防風湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 下痢しやすい人。
  - 高齢者。
- 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。
  - 次回の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病

- \* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	のぼせ、めまい、しびれ感、 どろき、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- \* (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

## 用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水600mL（約3合3勺）を加え、あまり強くない火にかけ300mL（約1合7勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

## 成分・分量

本品1袋中			
トウキ	3.0g	ニンジン	1.5g
シャクヤク	3.0g	キョウカツ	1.5g
ジオウ	3.0g	ゴシツ	1.5g
オウギ	3.0g	カンゾウ	1.5g
ハマボウフウ	3.0g	タイソウ	1.5g
トチュウ	3.0g	ショウキョウ	1.0g
ビャクジュツ	3.0g	加工ブシ末	0.3g
センキュウ	2.0g		

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

## 効能・効果

病状が慢性に経過して体力衰え、やせて貧血性となり熱状なく、下肢の運動麻痺と腫脹<sup>注1)</sup>、疼痛を起し、歩行困難または歩行不能となったもの、あるいは関節強直を起こして年月を経たもの。

関節リウマチ、脊髄炎、半身不随、脚気、産後の痠痛<sup>注2)</sup>

注1) 「腫脹<sup>しゅちやう</sup>」とは、はれを指します。

注2) 「痠痛<sup>いへき</sup>」とは下肢の運動麻痺、肢体がなえて動けなくなることを指します。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8