

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの大柴胡去大黄湯

ダイサイコキョダイオウトウ

ウチダの大柴胡去大黄湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

みぞおちが硬くはって抵抗圧痛感があり、胸や脇腹が重苦しくあるいは痛むもので、はき気、嘔吐、耳鳴、肩こり、不眠、舌苔、口渇、咳嗽^注、食欲不振などを伴うこともあり、便秘しないもの。

注)「咳嗽^{がいそう}」とは痰のある咳を指します。

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水800mL(約4合4勺)を加え、あまり強くない火にかけ、400mL(約2合2勺)に煮つめ、袋をとり出し、更に200mL(約1合1勺)に煮つめ2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品1袋中

サイコ	6.0g
ハンゲ	4.0g
ショウキョウ	1.5g
オウゴン	3.0g
シャクヤク	3.0g
タイソウ	3.0g
キジツ	2.0g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3