

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 半夏瀉心湯

ハンゲシャシントウ

ウチダの半夏瀉心湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の方は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
むくみ
(6)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
**肝機能障害	全身のたるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

* (2) 1ヵ月位(急性胃腸カタル、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

年齢	1日量
大人(15才以上)	1包を袋入りのまま、水約600mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食前又は食間に服用する。
15才未満7才以上	大人の煎液の2/3量を3回に分けて食前又は食間に服用する。
7才未満4才以上	大人の煎液の1/2量を3回に分けて食前又は食間に服用する。
4才未満2才以上	大人の煎液の1/3量を3回に分けて食前又は食間に服用する。
2才未満	大人の煎液の1/4量以下を3回に分けて食前又は食間に服用する。

用法・用量に関連する注意

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

* (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

成分・分量

本品1袋(1日分)中

ハンゲ	5.0g
オウゴン	2.5g
ニンジン	2.5g
カンゾウ	2.5g
タイソウ	2.5g
オウレン	1.0g
カンキョウ	2.5g
全量	18.5g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症:急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8