

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの茵陳五苓湯

インチンゴレイトウ

ウチダの茵陳五苓湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位(嘔吐、二日酔のむかつきに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

のどが渇いて、尿が少ないものの次の諸症: 嘔吐、じんましん、二日酔のむかつき、むくみ

用法・用量

| 年齢 | 1日量 |
|-----------|---|
| 大人(15歳以上) | 1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。 |
| 15歳未満 | 服用しないこと |

成分・分量

本品1袋(26.5g)中

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| タクシャ | 6.0g | ソウジュツ | 4.5g |
| チヨレイ | 4.5g | ケイヒ | 3.0g |
| ブクリョウ | 4.5g | インチンコウ | 4.0g |

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

◆本剤中にはソウジュツが配合されているため袋内に白色の結晶が析出することがありますが、品質上は問題ありません。

◆本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3