ご使用に際しては，この添付文書を必ずお読み下さい.また，必要な時に読めるよう大切に保管して下さい.

第２類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 茵蔯蒿湯

インチンコウトウ

ウチダの茵蔯蒿湯は漢方処方にしたがって，生薬を配合した煎じ薬で，特異な芳香があります.

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなる）

1．本剤を服用している間は，次の医薬品を服用しないこと
　他の瀉下薬（下剤）

2．授乳中の人は本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

1．次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
　(1)医師の治療を受けている人.
　(2)妊婦又は妊娠していると思われる人.
　(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人，体の弱い人）.
　(4)胃腸が弱く下痢しやすい人.

2．服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐，食欲不振，胃部不快感，はげしい腹痛を伴う下痢，腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある.その場合は直ちに医師の診療を受けること.

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱，かゆみ，発疹，黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)，褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる.
腸間膜静脈硬化症	長期服用により，腹痛，下痢，便秘,腹部膨満等が繰り返しあらわれる.

3．服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この文書をもって医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
　下痢

4．１週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

5．長期連用する場合には，医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

胸ぐるしく，のどがかわき便秘し，尿量が減少するもの，また微熱，腹満，めまい，嘔気，皮膚掻痒感などを伴うもの。
蕁麻疹，口内炎，腎炎。

用法・用量

年齢	１日量
大人（15歳以上）	１袋（１日分）につき水600mL（約３合３勺）を加えあまり強くない火にかけ300mL（約１合７勺）に煮つめ，袋をとり出し，２～３回に分けて食前１時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品１袋中
インチンコウ　4.0ｇ
サンシシ　3.0ｇ
ダイオウ　1.0ｇ

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること.
(2)小児の手の届かない所に保管すること.
(3)他の容器に入れ替えないこと.（誤用の原因になったり品質が変わる.）

●お問い合わせ先
本品の内容についてのお問い合わせは，お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます.
株式会社ウチダ和漢薬　お客様相談センター
ＴＥＬ　０３－３８０６－４１４１
受付時間　9：00～17：30（土，日，祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので，製品により多少色が異なることがありますが，効能・効果にかわりはありません.

株式会社 ウチダ和漢薬
＊ 新潟県上越市大潟区蜘ケ池1755-3