

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 参蘇飲

ジンソイン

ウチダの参蘇飲は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

* 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。

* (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- (5) 次の症状のある人。
むくみ

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

* (2) 1週間服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

感冒、せき

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水約600mLを加え、あまり強くない火にかけ約300mLに煮つめ、袋をとり出し3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
15歳未満7歳以上	大人の煎液の2/3量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
7歳未満4歳以上	大人の煎液の1/2量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
4歳未満2歳以上	大人の煎液の1/3量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
2歳未満	大人の煎液の1/4量以下を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。

用法・用量に関連する注意

* (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

* (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品1袋(1日分)中

ソ ヨ ウ	1.0g	ニ ン ジ ン	1.5g
キ ジ ツ	1.0g	タ イ ソ ウ	1.5g
キ ヨ ウ	2.0g	シ ヨ ウ キ ヨ ウ	0.5g
チ ン ビ	2.0g	モ ッ コ ウ	1.0g
カ ッ コ ン	2.0g	カ ン ゾ ウ	1.0g
ハ ン ゲ	3.0g	ゼ ン コ	2.0g
ブ ク リ ヨ ウ	3.0g		

全 量 21.5g

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8