

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

## ウチダの漢方製剤

## ウチダの 九味檳榔湯

クミビンロウトウ

ウチダの九味檳榔湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- \* 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
- \* 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- \* (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 高齢者。
- \* (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。  
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
- \* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- \* (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
- \* 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
下痢

## 効能・効果

全身倦怠感、ことに脚の倦怠感が著しく、動悸、息ぎれ、浮腫などを伴う場合で水分貯溜傾向のあるもの。  
脚気、神経症、高血圧症。

## 用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水 600mL（約3合3勺）を加え、あまり強くない火にかけ 300mL（約1合7勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

## 成分・分量

本品1袋中			
ビンロウジ	4.0g	ダイオウ	1.0g
コウボク	3.0g	モッコウ	1.0g
ケイヒ	3.0g	カンゾウ	1.0g
キッピ	3.0g	ソヨウ	1.5g
ショウキョウ	1.0g		

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8