

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

# ウチダの人参養栄湯

ニンジンヨウエイトウ

ウチダの人参養栄湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

やせて顔色悪く発熱、悪寒があり四肢倦怠感あり喘咳<sup>注1)</sup>、喀痰<sup>注2)</sup>、自汗、不眠、食欲不振などを伴うもの  
病後の衰弱、産後の衰弱、結核症の衰弱、虚弱体質

注1) 「喘咳」とは喘して痰のある咳をするものを指します。

注2) 「喀痰」とは吐いた痰を指します。

## 用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水600mL（約3合3勺）を加え、あまり強くない火にかけ300mL（約1合7勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

## 成分・分量

本品1袋中

ジ オ ウ	4.0g	オ ン ジ	2.0g
ト ウ キ	4.0g	チ ン ビ	2.0g
ソ ウ ジ ュ ツ	4.0g	オ ウ ギ	2.0g
ブ ク リ ヨ ウ	4.0g	ニ ン ジ ン	3.0g
ケ イ ヒ	2.5g	カ ン ソ ウ	1.0g
シャクヤク	2.0g	ゴ ミ シ	1.0g

## 成分・分量に関連する注意

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがある。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤中にはソウジュツが配合されているため袋内に白色の結晶が析出することがありますが、品質上は問題ありません。本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10