

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの 黄連湯

オウレントウ

ウチダの黄連湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剂で、特異なおいがあります。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

**お問い合わせ先**

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

**使用上の注意****相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

## \* (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

\* (2) 1ヵ月位(急性胃炎、二日酔に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

**効能・効果**

胃部の停滞感や、重圧感、食欲不振のあるものの次の諸症：急性胃炎、二日酔、口内炎。

**用法・用量**

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mLを加え煮て300mLとし袋をとりだし、3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

**成分・分量**

本品1袋(1日分)中	
オウレン	3.0g
カンゾウ	3.0g
カンキョウ	3.0g
ニンジン	3.0g
ケイヒ	3.0g
タイソウ	3.0g
ハング	6.0g
全量	24.0g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8