

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

# ウチダの 苓桂朮甘湯

リョウケイジュツカントウ

ウチダの苓桂朮甘湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

## 効能・効果

たちくらみやめまい、動悸、頭痛、耳鳴、のぼせなどがあり、利尿減少、足冷え、胃部の水分停滞感などを伴うもの。

## 用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水400mL(約2合2勺)を加えあまり強くない火にかけ200mL(約1合1勺)に煮つめ袋をとり出し2~3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

## 成分・分量

本品1袋中  
ブクリョウ 6.0g  
ケイヒ 4.0g  
ソウジュツ 3.0g  
カンゾウ 2.0g

\* 本剤中にはソウジュツが配合されているため袋内に白色の結晶が析出することがありますが、品質上は問題ありません。本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬  
東京都中央区日本橋本町 4-2-8