

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 柴胡加龍骨牡蛎湯

サイコカリユコツボレイトウ

ウチダの柴胡加龍骨牡蛎湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎劑で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

* 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- * (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

(5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(6) 次の医薬品を服用している人。

瀉下薬（下剤）

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、 <u>腹痛</u>

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
* 肝機能障害	<u>全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。</u>
* 間質性肺炎	<u>せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。</u>

(2) 1ヵ月位（小児夜なきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

* 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15才以上）	1袋（1日分）につき水600mLを加え、あまり強くない火にかけ300mLに煮つめ、袋を取り出し、3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15才未満7才以上	大人の煎液の2/3量を3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
7才未満4才以上	大人の煎液の1/2量を3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
4才未満2才以上	大人の煎液の1/3量を3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
2才未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品1袋中

サイコ	5.0g	ショウキョウ	1.0g
ハンゲ	4.0g	ニンジン	2.5g
ブクリョウ	3.0g	リュウコツ	2.5g
ケイヒ	3.0g	ボレイ	2.5g
オウゴン	2.5g	ダイオウ	1.0g
タイソウ	2.5g		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

精神不安があつて、どうき、不眠などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜なき

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8