

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

# ウチダの 七物降下湯

シチモツコウカトウ

ウチダの七物降下湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。

### ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効能・効果

身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症

高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)

### 用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)に対し、水600mLを加え、あまり強くない火にかけ、300mLに煮つめてから、袋をとりだし、2~3回に分けて、食前1時間又は食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

### 成分・分量

本品1袋(1日分)中

トウキ 3.0g オウギ 3.0g  
センキュウ 3.0g オウバク 2.0g  
シャクヤク 3.0g チョウトウコウ 4.0g  
ジョウ 3.0g

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3