

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

# ウチダの 四逆湯

シギヤクトウ

ウチダの四逆湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。



### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効能・効果

四肢厥冷<sup>(注)</sup>し、身体疼痛し、不消化便の下痢あるいは尿利多いもの、あるいは腹部張満、嘔吐、発熱、悪寒、頭痛、発汗などを伴うもの。

急性吐瀉病、急性慢性腸炎、自家中毒病、下痢症、感冒。

注)<sup>(注)</sup>「厥冷」とは四肢の末端から冷えることを指します。

### 用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水300mL(約1合7勺)を加え、あまり強くない火にかけ150mL(約8勺)に煮つめ、袋を取り出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

### 成分・分量

本品1袋中  
カンゾウ 3.0g  
ショウキョウ 2.0g  
ブシ末 1 0.3g

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

### ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 お客様相談センター  
TEL 03-3806-4141  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\*新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3