

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

# ウチダの 辛夷清肺湯

シンイセイハイトウ

ウチダの辛夷清肺湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剂で、特異なおいがあります。

### 成分・分量

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| 本品1袋中 |    |          |
| シ     | ン  | イ 2.0g   |
| ピ     | ワ  | ヨ 2.0g   |
| チ     |    | モ 3.0g   |
| ビ     | ャク | ゴウ 3.0g  |
| オ     | ウ  | ゴン 3.0g  |
| サ     | ン  | シ 3.0g   |
| バク    | モ  | ンドウ 5.0g |
| セ     | ツ  | コウ 5.0g  |
| シ     | ョ  | ウ 1.0g   |
| マ     |    |          |

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

### お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなる)

- 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4)胃腸虚弱で冷え症の人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

\* (1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状         |
|------|------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称  | 症状                             |
|--------|--------------------------------|
| 間質性肺炎  | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。      |
| *肝機能障害 | 全身のたるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。 |

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

鼻閉塞、鼻茸、肥厚性鼻炎、上顎洞化膿症

### 用法・用量

| 年齢        | 1日量  |
|-----------|--|
| 大人(13才以上) | 1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ、300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。 |
| 13才未満5才迄  | 大人の煎液の1/2量を2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。   |
| 5才未満      | 大人の煎液の1/3量を2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。   |

### 用法・用量に関連する注意

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

\* (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8