

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの 神秘湯

シンピトウ

ウチダの神秘湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎劑で、特異な芳香があります。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなる)  
次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合
 

関係部位	症状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
  - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

## 用法・用量

年齢	1日量
大人(13才以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
13才未満5才迄	大人の煎液の1/2量を2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
5才未満	大人の煎液の1/3量を2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。

## 用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。  
\* (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品1袋中			
マオウ	5.0g	カンゾウ	2.0g
キョウニン	4.0g	サイコ	2.0g
コウボク	3.0g	ソヨウ	1.5g
チンピ	2.5g		

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

## 効能・効果

咳嗽<sup>注1)</sup>発作時に呼吸困難があり喀痰<sup>注2)</sup>は少なく気鬱<sup>注3)</sup>の神経症が加わったもので病症のやや慢性化したもの。

気管支喘息<sup>ぜんそく</sup>、小児喘息<sup>ぜんそく</sup>

注1)「咳嗽」とは痰のある咳を指します。

注2)「喀痰」とは吐いた痰を指します。

注3)「気鬱」とは気のうっつけを指します。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬  
東京都中央区日本橋本町 4-2-8