

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 疎経活血湯

ソケイカクツトウ

ウチダの疎経活血湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。

成分・分量

本品1包（1日分）中			
トウキ	2g	ボウイ	1.5g
ジオウ	2g	キョウカツ	1.5g
ソウジュツ	2g	ボウフウ	1.5g
センキュウ	2g	リュウタン	1.5g
トウニン	2g	ショウキョウ	0.5g
ブクリョウ	2g	チンピ	1.5g
シャクヤク	2.5g	ビヤクシ	1g
ゴシツ	1.5g	カンゾウ	1g
イレイセン	1.5g		
全量			27.5g



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1包（1日分）につき、水600mLを加え、あまり強くない火にかけ、300mLに煮つめ、袋をとり出し、3回に分けて食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

◆本剤中にはソウジュツが配合されているため袋内に白色の結晶が析出することがありますが、品質上は問題ありません。

◆本剤は生薬を原料としていますので製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3