

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

## ウチダの漢方製剤

## ウチダの 芍薬甘草湯

シャクヤクカンゾウトウ

ウチダの芍薬甘草湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎劑で、特異なおいがあります。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 次の人は服用しないこと  
次の診断を受けた人。  
心臓病
- 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないこと



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
うっ血性心不全 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合

## 成分・分量

本品1袋中  
シャクヤク 6.0g  
カンゾウ 6.0g

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

## 効能・効果

腹直筋痙攣<sup>けいれん</sup>し、腹痛するもの、あるいは四肢筋肉の痙攣<sup>けいれん</sup>、疼痛あるもの  
腹痛、坐骨神経痛、腰痛、胃痙攣<sup>けいれん</sup>、排尿痛

## 用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水600mL（約3合3勺）を加え、あまり強くない火にかけ300mL（約1合7勺）に煮つめ、袋をとり出し、2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8