

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 生姜瀉心湯

ショウキョウシャシントウ

ウチダの生姜瀉心湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- * (2) 1ヵ月位(胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなりません。
- 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

みぞおちがつかえた感じがあり、げっぷを伴う次の諸症：
食欲不振、胸やけ、吐きけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭。

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1包につき、水600mLを加え、あまり強くない火にかけ、300mLに煮つめ、袋をとり出し、3回に分けて食前または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品1包(1日分)中			
ハ ン ゲ	5.0g	タ イ ソ ウ	2.5g
ニ ン ジ ン	2.5g	オ ウ レ ン	1.0g
オ ウ ゴ ン	2.5g	カ ン キ ョ ウ	1.5g
カ ン ソ ウ	2.5g	シ ョ ウ キ ョ ウ	0.5g
全 量		18.0g	

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8