

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの小青龍湯

ショウセイリュウトウ

ウチダの小青龍湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|-----------|---|
| *間質性肺炎 | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸 (皮ふや白目が黄色くなる) 等があらわれる。 |

- 1 ヶ月位 (鼻水、うすい水様のたんを伴う咳に服用する場合には 5 ~ 6 日間) 服用しても症状がよくなる場合
- 3 . 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

気管支炎、気管支ぜんそく、鼻水、うすい水ようのたんを伴うせき、鼻炎

用法・用量

| 年 齢 | 1 日 量 |
|-------------|--|
| 大人 (15 歳以上) | 1 袋を、水約 400mL をもって煮て約 200mL に煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間 3 回に分服する。 |
| 15 歳未満 | 服用しないこと |

成分・分量

| 本品 1 日量 (1 袋) 中 | | | |
|-----------------|----|-------|---------|
| マ オ ウ | 2g | ケ イ ヒ | 2g |
| シャクヤク | 2g | サイシン | 2g |
| ショウキョウ | 2g | ゴ ミ シ | 3g |
| カンゾウ | 2g | ハンゲ | 3g |
| | | | 全 量 18g |

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141
受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8