

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの 薏苡仁湯

ヨクイニントウ

ウチダの薏苡仁湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。

## 成分・分量

本品1袋中	
マ オ ウ	4.0g
ト ウ キ	4.0g
ビャクジュツ	4.0g
ヨクイニン	8.0g
ケ イ ヒ	3.0g
シャクヤク	3.0g
カンゾウ	2.0g


## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

 使用上の注意


## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

## 効能・効果

四肢疼痛、麻痺があり四肢屈伸困難なもので亜急性期および慢性期に移行したもの  
多発性関節リウマチ、漿液性関節炎、筋肉リウマチ

## 用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水600mL（約3合3勺）を加え、あまり強くない火にかけ300mL（約1合7勺）に煮つめ、袋をとり出し2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬  
東京都中央区日本橋本町 4-2-8