

第3類医薬品

ウチダの サフラン

日本薬局方 サフラン



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

効能・効果

冷え症、血色不良

用法・用量

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	0.3gに熱湯100~150mLを加え、5~10分後にそのまま服用する。
15歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量(0.9g)中

日本薬局方サフラン 0.9g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

MSJ



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-3