

第3類医薬品

◆ウチダの和漢生薬◆

ウチダの せんぶり

日本薬局方 センブリ



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

効能・効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1.5gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用する。
15歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量(1.5g)中
日本薬局方センブリ 1.5g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っております。

MSJ



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里 4-3-3