

第3類医薬品

◆ウチダの和漢生薬◆

ウチダの よくいにん

日本薬局方 ヨクイニン



使用上の注意

相談すること

- 次の人服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 長期間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

効能・効果

いぼ、皮膚のあれ

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15才以上）	20gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
15才未満	服用しないこと

（用法・用量に関する注意）

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量（20g）中

日本薬局方ヨクイニン 20g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

NMK



株式会社 ウチダ和漢薬
新潟県上越市大潟区蜘蛛池 1755-3