

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 六君子湯 エキス細粒

リックンシトウ

ウチダの六君子湯エキス細粒は、漢方処方にしたい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすく細粒としたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後 3 ヶ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品 6 g（1 日分）中

六君子湯エキス（1/2 量）……………2.90 g

ニンジン……………	2.0 g
ビャクジュツ……………	2.0 g
ブクリョウ……………	2.0 g
ハンゲ……………	2.0 g
チンピ……………	1.0 g
タイソウ……………	1.0 g
カンゾウ……………	0.5 g
ショウキョウ……………	0.25 g

賦形剤として乳糖水和物・部分アルファー化デンプン、吸湿防止剤として軽質無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回、食前又は食間に水又は白湯で服用

年 齢	1 回 量
大人（15 歳以上）	2 g
15 歳未満 7 歳以上	大人の 2/3 の量
7 歳未満 4 歳以上	大人の 1/2 の量
4 歳未満 2 歳以上	大人の 1/3 の量
2 歳未満	大人の 1/4 以下の量

〈用法・用量に関連する注意〉

- 添付のサジ 1 ばいが約 1 g です。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区蚬ヶ池 1755-3